

COMIRNATY (Pfizer/BioNTech)**2. ADAG: 35 nap****Terhesség és szoptatás:**

Alkalmazása terhesség és szoptatás alatt megfontolható, ha a lehetséges előnyök meghaladják a lehetséges kockázatokat az anya és a magzat szempontjából.

Nem adható:

- A vakcina bármely összetevőjével szembeni igazolt súlyos allergiás reakció *(az anamnézisben szereplő egyéb gyógyszerallergia/anafilaxiás reakció, akár súlyos forma nem jelent kontraindikációt)*
- Akut lázas betegség

MODERNA**2. ADAG: 28 nap****Terhesség és szoptatás:**

Alkalmazása terhesség és szoptatás alatt megfontolható, ha a lehetséges előnyök meghaladják a lehetséges kockázatokat az anya és a magzat szempontjából.

Nem adható:

- A vakcina bármely összetevőjével szembeni igazolt súlyos allergiás reakció *(az anamnézisben szereplő egyéb gyógyszerallergia/anafilaxiás reakció, akár súlyos forma nem jelent kontraindikációt)*
- Akut lázas betegség

VAXZEVRIA (AstraZeneca)**2. ADAG: 12 hét****Nem adható:**

- A vakcina bármely összetevőjével szembeni igazolt súlyos allergiás reakció *(az anamnézisben szereplő egyéb gyógyszerallergia/anafilaxiás reakció, akár súlyos forma nem jelent kontraindikációt)*
- Akut lázas betegség

Nagyon ritka (10.000-ből legfeljebb 1 beteget érinthet) besorolási gyakorisággal trombózis és trombocitopénia kombinációját figyelték meg a Vaxzevria beadását követően. *Az oltottakat figyelmeztetni kell, hogy azonnal forduljanak orvoshoz, ha nehézlégzést, mellkasi fájdalmat, lábduzzanatot, tartós hasi fájdalmat, súlyos vagy tartós fejfájást, homályos látást, vagy a néhány nappal az oltás után jelentkező pontszerű vézést (nem az oltás helyén) tapasztalnak az oltást követően.*

SZPUTNYIK-V**2. ADAG: 21 nap****Nem adható:**

- A vakcina bármely összetevőjével szembeni igazolt súlyos allergiás reakció *(az anamnézisben szereplő egyéb gyógyszerallergia/anafilaxiás reakció, akár súlyos forma nem jelent kontraindikációt)*
- Akut lázas betegség
- Az immunrendszert gyengítő gyógyszeres kezelés kontraindikációt jelent legalább egy-egy hónappal az oltás beadása előtt és után a csökkent immunogenitás veszélye miatt.

Elővigyázatossággal alkalmazható:

- Autoimmun betegség *(az immunrendszer stimulálása a betegség fellángolásához vezethet)*
- Krónikus vese- vagy májbetegség
- Endokrin betegségek *(egyensúlyban lévő cukorbeteg és pajzsmirigybeteg kaphatja)*
- Heveny szívbetegség *(ACS, myocarditis, endocarditis, pericarditis),*
- Akut agyi keringési történet *(stroke, TIA)*
- Epilepszia, ill. egyéb idegrendszeri betegség
- Daganatos betegség *(aktív kezelés alatt, vagy 5 éven belül nem javasolt)*

SINOPHARM**2. ADAG: 21-28 nap****Nem adható:**

- A vakcina bármely összetevőjével szembeni igazolt súlyos allergiás reakció *(az anamnézisben szereplő egyéb gyógyszerallergia/anafilaxiás reakció, akár súlyos forma nem jelent kontraindikációt)*
- Akut lázas betegség
- Nem megfelelően egyensúlyban tartott krónikus betegség vagy a betegség akut fellángolása
- Epilepszia, vagy egyéb progresszív neurológiai betegség

Az erekbe való beadása szigorúan tilos!

Antikoagulált betegeknek mindegyik vakcina adható, a vakcinát inzulinos tűvel kell beadni, 5 perces helyi kompresszió szükséges.